

TETRAxIM

Качествен и количествен състав

Една доза (0,5ml) съдържа:

Дифтериен токсид ⁽¹⁾> 30 IU

Тетаничен токсид ⁽¹⁾> 40 IU

Антигени на *Bordetella pertussis*:

Пертусис токсид ⁽¹⁾ - 25 микрограма

Филаментозен хемаглютинин ⁽¹⁾ - 25 микрограма

Тип I (щам Mahoney) - 40 DU ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Тип 2 (щам MEF-1) - 8 DU ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Тип 3 (щам Saukett) - 32 DU ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ :адсорбиран на алуминиев хидроксид, дихидрат - 0,3 mg Al ³⁺

⁽²⁾ DU: единици D-антиген

⁽³⁾ :или еквивалентно антигенно количество, определено чрез подходящ имунохимичен метод.

⁽⁴⁾ :Произведен върху VERO клетки

Списък на помощните вещества

Среда Ханкс (без фенолово червено), оцетна киселина и/или натриев хидроксид за корекция на рН, формалдехид, феноксиетанол, етанол и вода за инжекции.

Повече информация ще откриете в [листовката на продукта](#), достъпна на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата.